Généralités sur les fonctions

Exercice 1 (Vecteurs — 8 points)**.** *Soit $ABCD$ un parallélogramme. On place les points E tel que $\overrightarrow{DE} = \frac{\overrightarrow{AD}}{2}$*, et F tel que $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{AB}$.



1. *Faire une figure.*
2. *Montrer que $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB} + \frac{\overrightarrow{AD}}{2}$.* Comme dans la question suivante, on utilise la relation de Chasles, la relation du parallélogramme ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, et la définition du point E).

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CE} &= \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} \\ &= \overrightarrow{BA} + \frac{\overrightarrow{AD}}{2} \\ &= -\overrightarrow{AB} + \frac{\overrightarrow{AD}}{2}\end{aligned}$$

3. *Exprimer $\overrightarrow{CF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.*

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CF} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BF} \\ &= -\overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

4. *Que peut-on dire des points E, C et F ?* D'après les questions précédentes, dans ce repère, on a $\overrightarrow{CE}\binom{-1}{\frac{1}{2}}$ et $\overrightarrow{CF}\binom{2}{-1}$.

Vérifions la relation de colinéarité : $(-1) \times (-1) - 2 \times \frac{1}{2} = 1 - 1 = 0$. Donc les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont colinéaires, et les points C, E, F sont alignés.

Exercice 2 (Dérivation — 3 points)**.** *On considère la fonction f, dont voici la représentation graphique.*



Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

1. *Combien vaut $f'(1)$?* $f'(1) = 2$
2. *Combien vaut $f'(-1)$?* $f'(-2) = 0$
3. *Donner un nombre x tel que $f'(x) = 1$.* $f'(2,3) = f'(-1.3) = 1$

Exercice 3 (Droites — 9 points)**.** *Le plan est rapporté au repère orthonormé ci-dessous.*



1. *Tracer la droite d d'équation $y = -\frac{2}{3}x - 2$.*
   Préciser son coefficient directeur et donner un de ses vecteurs directeurs. Son coefficient directeur est $-\frac{2}{3}$. Un de ses vecteurs directeurs est donc le vecteur de coordonnées $\binom{1}{-\frac{2}{3}}$.

2. *Vérifier que les points $A(3; -4)$ et $B(-3; 0)$ sont des points de d.* Ces points sont sur la droite si leurs coordonnées vérifient l'équation de la droite.
   Premièrement, $-\frac{2}{3} \times 3 - 2 = -2 - 2 = -4$, donc $A\,(3; -4)$ appartient à la droite. De même, $-\frac{2}{3} \times (-3 - 2 = 2 - 2 = 0)$, donc $B\,(-3; 0)$ appartient aussi à la droite.

3. *Construire la droite Δ passant par le point $D(2; -1)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{v}(6, -4)$. Déterminer une équation cartésienne de Δ.*
   Soit $M\,(x; y)$ un point du plan. Ce point appartient à la droite Δ si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{DM}\binom{x-2}{y+1}$ et $\overrightarrow{v}$ sont

colinéaires, c'est-à-dire si :

$$\begin{aligned}(x-2)\times(-4)-(y+1)\times 6&=0\\ -4x+8-6y-6&=0\\ -4x-6y+2&=0\end{aligned}$$

L'équation $-4x-6y+2=0$ est donc une équation cartésienne de la droite.

4. *Démontrer que les droites d et Δ sont parallèles.* Les deux droites ont pour vecteurs directeurs respectifs $\overrightarrow{u}\binom{1}{-\frac{2}{3}}$ et $\overrightarrow{v}\binom{6}{-4}$. Vérifions la condition de colinéarité : $1\times(-4)-6\times\left(-\frac{2}{3}\right)=-4+4=0$. Donc les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires. Les droites d et Δ ont donc leurs vecteurs directeurs colinéaires : elles sont parallèles.