

Exercice 1 (Dérivées — 4 points). *Calculer la dérivée des fonctions suivantes.*

1. $f : x \mapsto 3x^2 - 2\sqrt{x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \times 2x - 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= 6x - \frac{1}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

2. $g : x \mapsto (2x - 1)(1 - x)$

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2(1 - x) + (-1)(2x - 1) \\ &= 2 - 2x - 2x + 1 \\ &= -4x + 3 \end{aligned}$$

Il était aussi possible de commencer par développer g , puis de dériver la forme développée, qui est un polynôme. Le résultat doit être le même.

Exercice 2 (Temps d'attente — 4 points). *Une gérante veut mettre en place les files d'attente dans son nouveau magasin. Elle hésite entre deux méthodes :*

1. *il y a une file d'attente pour chaque caisse (comme dans les supermarchés) ;*
2. *il y a une seule file d'attente pour toutes les caisses, et les clients sont répartis au dernier moment vers une caisse libre (comme dans les gares SNCF).*

Pour choisir, elle simule une fois pour chacune des deux méthodes, l'arrivée de 1000 clients, dans les mêmes conditions.


Elle observe les temps d'attente suivants pour la file type « supermarché » :

Temps d'attente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Effectif	32	101	150	145	98	122	123	101	60	68

Pour la file de type « SNCF », elle obtient un temps d'attente moyen de 5,4 minutes, et un écart-type de 1,9 minutes.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type des temps d'attente de la file type « supermarché ». À la calculatrice, on trouve $\bar{x} = 5,375$ et $\sigma \approx 2,49$.
2. Quelle type de file choisiriez-vous ? Justifier. La moyenne est sensiblement la même (ou alors est exactement la même si 5,4 minutes est en fait un arrondi de 5,375). À temps d'attente moyen égal, il est préférable d'avoir un écart-type petit. Un grand écart type signifie qu'il y a de grandes disparités : certaines files vont avancer très vite, et d'autres très lentement. Cela va engendrer un sentiment de frustration. Avec une file unique, en revanche (et un écart-type petit), tout le monde attend (à peu de choses près) aussi longtemps.

Exercice 3 (Parallélogramme — 6 points). On considère le parallélogramme suivant.



1. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 5,5$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} &= \frac{1}{2} \left(\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\|^2 - AB^2 - AD^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\|\overrightarrow{AC}\|^2 - AB^2 - AD^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (6^2 - 4^2 - 3^2) \\ &= 5,5\end{aligned}$$

2. En utilisant une autre expression du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$, en déduire la mesure de l'angle \widehat{BAD} (arrondi à $0,1^\circ$ ou $0,01$ radians près). Nous utilisons la formule du cosinus :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} &= AB \cdot AD \cdot \cos \widehat{BAD} \\ &= 4 \times 3 \times \cos \widehat{BAD} \\ &= 12 \cos \widehat{BAD}\end{aligned}$$

En utilisant le résultat précédent, cela donne $5,5 = 12 \cos \widehat{BAD}$, soit $\cos \widehat{BAD} = \frac{5,5}{12}$. Une mesure de l'angle \widehat{BAD} est donc $62,7^\circ$ ou $1,09$ rad.

3. (a) Développer $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD})^2$. C'est une identité remarquable : $(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD})^2 = BA^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD} + AD^2$.
- (b) En déduire la valeur exacte de la longueur BD .
Nous remarquons que $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$, et que

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD}.$$

$$(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD})^2 = BA^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD} + AD^2$$

$$BD^2 = BA^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + AD^2$$


$$BD^2 = 4^2 - 2 \times 5,5 + 3^2$$

$$BD^2 = 14$$

$$BD = \sqrt{14}$$

Exercice 4 (Lieu géométrique — 6 points).

Dans la figure ci-contre, on place un point M sur la droite d'équation $y = x$; ses coordonnées sont donc (x, x) (où x est un réel). Le but de l'exercice est de déterminer les positions possibles de M telles que les droites (AM) et (BM) soient perpendiculaires.



1. Montrer que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (x - 3)(2x - 3)$. Les coordonnées de A , B et M sont respectivement $A(2; 3)$, $B(3; 1)$ et $M(x; x)$. Donc les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AM} et \overrightarrow{BM} sont $\overrightarrow{AM}(x - 2; x - 3)$ et $\overrightarrow{BM}(x - 3; x - 1)$. Donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} &= (x - 2)(x - 3) + (x - 3)(x - 1) \\ &= (x - 3)((x - 2) + (x - 1)) \\ &= (x - 3)(2x - 3) \end{aligned}$$

2. Résoudre $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$. Puisque $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (x - 3)(2x - 3)$, c'est une équation produit, dont les solutions sont $x = 3$ et $x = \frac{3}{2}$.

3. Répondre au problème posé : Quelles sont les positions possibles de M ? Les droites (AM) et (BM) sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs correspondants sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc $x = 3$ ou $x = \frac{3}{2}$, et donc les coordonnées possible de M sont $(3; 3)$ et $(\frac{3}{2}; \frac{3}{2})$.